



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



GEOMETRÍA

Tema: Troncos de Pirámide y Cono


academiacesarvallejo.edu.pe

PROBLEMA 1


RESOLUCIÓN

En el gráfico se muestra un tronco de pirámide regular de aristas básicas a y b , y altura c . Calcule el volumen del sólido $V-BCG$.

Calcule el volumen del sólido $V-BCG = \sqrt{x}$




- A) $\frac{abc}{3}$
 B) $\frac{abc}{6}$
 C) $\frac{abc}{9}$
 D) $\frac{abc}{18}$
 E) $\frac{abc}{27}$



Se cumple:

$$V_{AEF-DEF} = (A_{S.R.}) \frac{(a)}{3}$$



$$* \sqrt{x} = (A_{S.R.}) \cdot \frac{a}{3} = \left(\frac{1}{2} \cdot b \cdot c \right) \cdot \frac{a}{3}$$

$$\therefore \sqrt{x} = \frac{abc}{6}$$

PROBLEMA 2

Una pirámide $V-ABC$ tiene un ángulo triédrico trirectángulo en V . Si las áreas de las regiones VAC , VAB y VBC son S_1 , S_2 y S_3 , calcule el volumen de esa pirámide.

- A) $\sqrt{S_1 S_2 S_3}$ B) $\frac{1}{3} \sqrt{S_1 S_2 S_3}$ C) $\frac{1}{8} \sqrt{S_1 S_2 S_3}$
D) $\frac{1}{3} \sqrt{2 S_1 S_2 S_3}$ E) $\frac{1}{2} \sqrt{3 S_1 S_2 S_3}$

Datos:

$$A_{VAC} = S_1 = \frac{ab}{2}$$

$$A_{VAB} = S_2 = \frac{ac}{2}$$

$$A_{VBC} = S_3 = \frac{bc}{2}$$

$$\Rightarrow S_1 S_2 S_3 = \frac{(abc)^2}{8}$$


$$2\sqrt{2 S_1 S_2 S_3} = abc \dots (2)$$

RESOLUCIÓN

Calcule el volumen de la pirámide $V-ABC$. $= \sqrt{x}$

$$* \sqrt{x} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{a \cdot b}{2} \right) \cdot c$$

$$\sqrt{x} = \frac{1}{6} abc \dots (1)$$



* (2) en (1):

$$\therefore \sqrt{x} = \frac{1}{3} \sqrt{2 S_1 S_2 S_3}$$


PROBLEMA 3

Se tiene un cono equilátero de altura igual a 4 m, si se toma como diámetro la altura del cono se construye una esfera. Calcule el volumen del tronco de cono que se determina.

- A) $\frac{35\pi}{8}$ B) $\frac{36\pi}{7}$ C) $\frac{37\pi}{9}$
D) $\frac{45\pi}{7}$ E) $\frac{38\pi}{5}$

RESOLUCIÓN

Calcule el volumen del tronco de cono determinado. $= V_{T.C}$




$$V_{T.C} = \frac{\pi h}{3} (R^2 + r^2 + Rr)$$

$$\sqrt{T.C} = \frac{\pi}{3} \times (1) \left((13)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{3}} \right)^2 + \sqrt{3} \times \frac{4}{\sqrt{3}} \right)$$


$$\therefore \sqrt{T.C} = \frac{37\pi}{9}$$

PROBLEMA 4

En el tronco de pirámide mostrado, las áreas de las regiones paralelas ABC , MNP , DEF son A , X , B , respectivamente. Entonces podemos afirmar que



RESOLUCIÓN



* Por semejanza

$$\frac{(PN)^2}{X} = \frac{(BC)^2}{A} = \frac{(FE)^2}{B}$$

$$\frac{PN}{\sqrt{X}} = \frac{BC}{\sqrt{A}} = \frac{FE}{\sqrt{B}} = K$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} PN &= K\sqrt{X} \\ BC &= K\sqrt{A} \\ FE &= K\sqrt{B} \end{aligned}$$

* Semejanza: $\triangle CBF$ (Trapezio)

$$K\sqrt{X} = \frac{K\sqrt{A} \cdot K\sqrt{B} + K\sqrt{B} \cdot K\sqrt{A}}{K\sqrt{B} + K\sqrt{A}}$$

$$\therefore \frac{2}{\sqrt{X}} = \frac{1}{\sqrt{A}} + \frac{1}{\sqrt{B}}$$

- A) $\sqrt{X} = \sqrt{A} + \sqrt{B}$
- B) $\frac{1}{\sqrt{X}} = \frac{1}{\sqrt{A}} + \frac{1}{\sqrt{B}}$
- C) $X = \sqrt{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$
- D) $\frac{2}{\sqrt{X}} = \frac{1}{\sqrt{A}} + \frac{1}{\sqrt{B}}$
- E) $X = \sqrt{A \cdot B}$


PROBLEMA 5

Una pirámide $O-MNL$ es intersecada con 2 planos paralelos a la base, uno de ellos determina la sección PQR ($P \in \overline{MO}$ y $Q \in \overline{ON}$) y el otro plano determina la sección ABC ($A \in \overline{OP}$ y $B \in \overline{OQ}$). El volumen $O-ABC = 64V$, $OB = BQ = 4$ y $QN = 5$, calcule el volumen del sólido $PQRMNL$.

- A) 1681 V • B) 1685 V C) 1678 V
D) 1768 V E) 1756 V

RESOLUCIÓN

Calcule el volumen del sólido $PQR - MNL = V_x$



* Similitud

$$\text{Líneas } 4 : 8 : 13$$

$$\text{Volúmenes } 4^3 : 8^3 : (13)^3$$

$$\Rightarrow 64V : 512V : 2197V$$

$$2197V$$

* Luego

$$V_x + 512V = 2197V$$

$$\therefore V_x = 1685V$$

PROBLEMA 6

En un tronco de cono recto $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son diámetros paralelos de sus bases de base menor y mayor respectivamente. Siendo $\overline{CA}$ una generatriz, en AB se ubica un punto M , tal que $m\angle CAM = m\angle CMD = 120^\circ$. Calcule el área de la superficie lateral de dicho sólido. Si $AM=2$ y $BM=8$.

- A) 50π B) 64π C) 24π
 D) 48π E) 36π

$$A_{s.L} = \pi g (R + r)$$

obs: $r = 5$


$g = 4$

$R = 7$

$$\therefore A_{s.L} = 48\pi$$

RESOLUCIÓN

Calcule el área de la superficie lateral del tronco.





PROBLEMA 7

El volumen de un tronco de revolución es V . Si una de sus bases es también base del cilindro de revolución inscrito en dicho tronco, calcule el volumen de dicho cilindro sabiendo que es equivalente al cono deficiente.

- A) $\frac{23V}{37}$ B) $\frac{26V}{37}$ C) $\frac{29V}{37}$
D) $\frac{25V}{37}$ • E) $\frac{27V}{37}$

RESOLUCIÓN

Calcule el volumen del cilindro.




PROBLEMA 8

En un tronco cono de revolución los diámetros AB y CD de las bases miden 6 cm y 12 cm; $\overline{AD} \cap \overline{BC} = \{T\}$. Calcule la razón de los volúmenes de los sólidos determinados por un plano paralelo a las bases y que contiene al punto T .

- A) 37/152 B) 40/171 C) 1/5
D) 1/3 E) 39/154

RESOLUCIÓN

Calcule la razón de volúmenes de los troncos determinados.



— ACADEMIA —

CÉSAR

VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe